㊿

Tegafur & Uracil 膠囊

主成份：Tegafur & Uracil
商品名：UFUR Capsule
中文商品名：友復膠囊
含量：Tegafur100 毫克及 Uracil 224 毫克/膠囊

作用：

Tegafur & Uracil 是化學治療劑。

用法：

1. **請依照醫師指示按時服用，勿自行增減藥量或任意停藥。**
2. **若合併其它藥物治療時，請確定每種藥品之服用時間，勿任意合用。**
3. **如果服藥後不久便吐出來，請告知醫師，確認是否需補服此次劑量。**

注意事項：

1. **本藥使您的抗菌力降低，應避免與有傳染病的人接觸；有任何感染症狀如發燒、發冷、喉嚨痛、下背或腹側痛、排尿困難或疼痛等，請立即就醫。**
2. **如果您曾經對此藥有過敏反應,請告知醫師。**
3. **服用此藥期間需避孕，但勿使用避孕丸。若懷疑受孕要馬上告知醫師。**
4. **服用本藥勿授乳。**
5. **請事先告知醫師您目前使用的所有藥品，以及曾經做過之任何治療。**
6. **治療前若有其它疾病（例如肝、腎病等），請告知醫師。**
7. **請定期回診以確定療效並追蹤病情，及做檢驗。**
8. **服用此藥時，除非您的主治醫師指示，否則不可打預防針、疫苗；與您親近的人（例如家人）也應避免服用口服的小兒麻痺疫苗。**
9. **請注重個人衛生（尤其是口腔、牙齒、皮膚、頭髮、及手），避免刀傷（例如刮鬍子、剪指甲）、意外碰撞造成瘀血或受傷。**
10. **如需看其他醫師，請主動告訴醫師目前您所使用的藥品。**
11. **這個藥會引起噁心、嘔吐，醫師可能會開預防用藥，如果藥物無效請告訴醫師。**
12. **使用此藥請勿同時併用抗病毒劑 sorivudine。**

此教育單張並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

忘記服藥時該怎麼辦？
如果及時想起請馬上服用，如果想起時已接近下一次服藥時間則略過一次，依照原定時間用藥，絕不可一次服用兩倍量並請告知醫師。

此藥可能引起的副作用有哪些，如果發生了該怎麼辦？

症狀	如何處理
發燒、發冷、喉嚨痛；口腔及唇部潰瘍、異常出血或瘀血、黑便、血尿、嚴重腹瀉、腹痛、嘔吐、皮膚出現針狀紅點、嚴重發疹、頭昏、厭食、倦怠等	請立即就醫
失去食慾、胃痛、掉髮、膚色變深等	請告知醫師，尤其是症狀持續或嚴重時

停藥後您的身體需要一段時間調適，在這期間如果有下列現象產生請與醫師告知：發燒、發冷、喉嚨痛、異常出血或瘀血、皮膚出現針狀紅點。

藥品該如何存放？
請參考藥袋說明。

NTUH